

DODATAK I
SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA

FORESTO 1,25 g + 0,56 g
ovratnik za mačke i pse ≤ 8 kg
KLASA: UP/I-322-05/21-01/589
URBROJ: 525-10/0549-21-3

1/21

kolovoz 2021

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Foresto 1,25 g + 0,56 g, ovratnik, za mačke i pse ≤ 8 kg

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 antiparazitski ovratnik (38 cm) sadržava:

Djelatne tvari:

Imidaklopid	1,25 g
Flumetrin	0,56 g

Pomoćne tvari:

Potpuni popis pomoćnih tvari vidi u odjeljku 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Ovratnik.

Sivi ovratnik, bez mirisa.

4. KLINIČKE POJEDINOSTI

4.1 Ciljne vrste životinja

Mačka i pas ≤ 8 kg.

4.2 Indikacije za primjenu, navesti ciljne vrste životinja

Mačka

Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se koristi za:

- Suzbijanje i sprječavanje infestacije mačaka buhama (*Ctenocephalides felis*) tijekom 7-8 mjeseci.
- Sprječavanje razvoja ličinki buha u neposrednom okolišu mačke tijekom 10 tjedana.
- Pomoć u liječenju i preventivnu mjeru u sprečavanju alergijskog dermatitisa uzrokovanog buhama (FAD – engl. „*flea allergy dermatitis*“).
- Proizvod ima dugotrajno akaricidno djelovanje na krpelje (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus turanicus*) i repelentni učinak (sprječava hranjenje) na krpelje (*Ixodes ricinus*) tijekom 8 mjeseci. Ovratnik je djelotvoran protiv larva, nimfa i odraslih krpelja.

Krpelji prisutni na mački prije tretmana ne moraju uginuti unutar 48 sati od stavljanja ovratnika, već mogu ostati pričvršćeni i vidljivi. Stoga se prilikom stavljanja ovratnika preporučuje ukloniti krpelje prisutne na mački. Sprječavanje infestacije novim krpeljima započinje unutar 2 dana nakon stavljanja ovratnika.

VMP se primjenjuje i za smanjenje rizika od bolesti mačaka koje se prenose posrednicima/vektorima (engl. „*Feline Vector Borne Diseases*“, FVBDS):

- bartoneloza (*Bartonella henselae*, koju prenosi *Ctenocephalides felis*),
- citauksoonoza (*Cytauxzoon felis*, koju prenosi *Ambylomma americanum*) i
- dipilidoza (*Dipylidium caninum*, koju prenosi *Ctenocephalides felis*).

Preporučuje se staviti ovratnik prije početka sezone buha i/ili krpelja, odnosno prije početka sezone povećanog rizika od infestacije.

Pas

VMP se koristi za:

FORESTO 1,25 g + 0,56 g
ovratnik za mačke i pse ≤ 8 kg

KLASA: UP/I-322-05/21-01/589

URBROJ: 525-10/0549-21-3

- Suzbijanje i sprječavanje infestacije pasa buhama (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*) tijekom 7-8 mjeseci.
 - Sprječavanje razvoja ličinki buha u neposrednom okolišu životinje tijekom 8 mjeseci.
 - Pomoć u liječenju i preventivnu mjeru u sprečavanju alergijskog dermatitisa uzrokovanog buhama (FAD – engl. „flea allergy dermatitis“).
 - Proizvod ima dugotrajno akaricidno djelovanje na krpelje (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*) i repelentni učinak (sprječava hranjenje) na krpelje (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) tijekom 8 mjeseci. Ovratnik je djelotvoran protiv larva, nimfa i odraslih krpelja.
- Krpelji prisutni na psu prije tretmana ne moraju uginuti unutar 48 sati od stavljanja ovratnika, već mogu ostati pričvršćeni i vidljivi. Stoga se prilikom stavljanja ovratnika preporučuje ukloniti krpelje prisutne na psu. Sprječavanje infestacije s novim krpeljima započinje unutar 2 dana nakon stavljanja ovratnika.
- Suzbijanje infestacije pasa paušima (*Trichodectes canis*).

VMP se primjenjuje i za smanjenje rizika od bolesti pasa koje se prenose posrednicima/vektorima (engl. „Canine Vector Borne Diseases“, CVBDs):

- babezioza (*Babesia canis* koju prenosi *Dermacentor reticulatus* i *Babesia canis vogeli* koju prenosi *Rhipicephalus sanguineus*),
- erlihioza (*Ehrlichia canis* koju prenosi *Rhipicephalus sanguineus*),
- borelijoza (*Borrelia burgdorferi s.l.* koju prenosi *Ixodes ricinus*),
- anaplazmoza (*Anaplasma phagocytophilum* koju prenosi *Ixodes ricinus* i *Anaplasma platys* koju prenosi *Rhipicephalus sanguineus*),
- dipilidoza (*Dipylidium caninum* kojeg prenosi *Ctenocephalides felis*) i
- lišmanioza (*Leishmania infantum* koju prenose papatači, npr. *Phlebotomus perniciosus*).

Preporučuje se staviti ovratnik prije početka sezone buha i/ili krpelja, odnosno prije početka sezone povećanog rizika od infestacije.

4.3 Kontraindikacije

VMP se ne smije primjenjivati:

- mačićima mlađim od 10 tjedana;
- štenadi mlađoj od 7 tjedana;
- životinjama preosjetljivim na djelatne ili na bilo koju od pomoćnih tvari.

4.4 Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja

Nakon stavljanja ovratnika postoji mogućnost da se pojedini krpelj prihvati na životinju. Stoga se u nepovoljnim okolnostima ne može u potpunosti isključiti prijenos zaraznih bolesti kojima posreduju krpelji. Krpelji će uginuti i otpustiti se s domaćina unutar 24-48 sati nakon infestacije, u pravilu bez uzimanja krvnog obroka.

Preporučuje se staviti ovratnik prije početka sezone buha i/ili krpelja.

Iako je dokazana znatno manja incidencija infekcije s *Leishmania infantum* u pasa, proizvod je pokazao varijabilnu repelentnu (sprječava hranjenje) i insekticidnu učinkovitost na papatače *Phlebotomus perniciosus*. Stoga se ugrizi papatača i prijenos *Leishmania infantum* ne mogu u potpunosti isključiti. Ovratnik je potrebno aplicirati prije početka razdoblja pojačane aktivnosti papatača što odgovara sezoni prijenosa *Leishmania infantum*.

Kao i kod drugih VMP-a za lokalnu primjenu na kožu, u razdoblju pojačanog linjanja (izmjena dlake) može biti prolazno i neznatno smanjen učinak kao posljedica gubitka djelatnih tvari u otpaljoj dlaci. S obzirom da se djelatne tvari iz ovratnika kontinuirano otpuštaju, odmah se počinju obnavljati učinkovite koncentracije djelatnih tvari u dlaci, bez potrebe za dodatnim tretmanom ili zamjenom ovratnika.

Za optimalni nadzor populacije buha u infestiranim domaćinstvima, preporučuje se tretirati okoliš životinja odgovarajućim insekticidom.

4.5 Posebne mjere opreza prilikom primjene

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama

Proizvod je voodootporan tj. ostaje djelotvoran nakon šamponiranja, kupanja u vodi ili ako životinja pokisne. No, dugotrajno i obilno kupanje ili šamponiranje treba izbjegavati jer se može umanjiti dužina trajanja antiparazitskog učinka. Istraživanja su pokazala da kupanje ili šamponiranje jednom mjesečno ne umanjuje značajno trajanje učinka od 8 mjeseci protiv krpelja (nakon preraspodjele djelatnih tvari u dlaci), dok se djelotvornost na buhe postupno smanjuje počevši od 5.-og mjeseca nošenja ovratnika. Utjecaj šamponiranja ili kupanja na sprečavanje prijenosa pseće lišmanioze nije ispitan.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama

Ovratnik treba držati u vrećici koja je u vanjskoj kutiji do trenutka primjene.

Kao što vrijedi i za druge VMP-e, maloj djeci ne smije se dozvoliti igranje s ovratnikom, a posebno ga ne smiju stavljati u usta. Mačkama i psima koji nose ovratnik ne smije se dozvoliti da spavaju u istom krevetu s vlasnikom, a posebno ne s djecom.

Imidaklopid i flumetrin se neprekidno otpuštaju iz ovratnika u kožu i dlaku dok je ovratnik na životinji. Proizvod može u nekih ljudi uzrokovati reakciju preosjetljivosti.

Osobe s poznatom preosjetljivošću (alergijom) na sastojke ovoga VMP-a trebaju izbjegavati dodir s ovratnikom.

U vrlo rijetkim slučajevima proizvod može uzrokovati nadražaj kože, očiju i dišnog sustava. U slučaju nadražaja oči treba isprati hladnom vodom. U slučaju reakcija na koži treba prati kožu sapunom i hladnom vodom. U slučaju da simptomi potraju, preporuča se potražiti pomoć liječnika i pokazati mu uputu o VMP-u ili etiketu.

Ostatke tj. višak ovratnika nakon postavljanja treba što prije neškodljivo ukloniti (vidjeti 4.9). Nakon što se životinji pričvrstiti ovratnik ruke treba oprati hladnom vodom.

4.6 Nuspojave (učestalost i ozbiljnost)

U životinja koje nisu naviknute na nošenje ovratnika u rijetkim slučajevima mogu se u prvih nekoliko dana nakon stavljanja ovratnika javiti promjene u ponašanju koje uključuju skrivanje, glasanje, hiperaktivnost, pretjerano lizanje ili čišćenje, češanje na mjestu primjene. U vrlo rijetkim slučajevima je zabilježena agresivnost nakon stavljanja ovratnika. Treba provjeriti da li je ovratnik pravilno stegnut.

Na mjestu primjene mogu se pojaviti lokalne reakcije: svrbež, crvenilo kože i gubitak dlake. Navedene promjene su rijetke u pasa i manje česte u mačaka i spontano nestanu unutar 1-2 tjedna. U pojedinim slučajevima ovratnik treba privremeno skinuti tj. dok navedeni simptomi nestanu.

Vrlo rijetko u pasa i rijetko u mačaka mogu se pojaviti lokalne reakcije kao što su dermatitis, upala, ekcem, ozljede ili krvarenja, te je u tim slučajevima preporučljivo skinuti ovratnik.

Rijetko se u pasa mogu pojaviti neurološki simptomi kao što su ataksija, konvulzija i tremor. U tim slučajevima je preporučljivo skinuti ovratnik.

FORESTO 1,25 g + 0,56 g

ovratnik za mačke i pse ≤ 8 kg

KLASA: UP/I-322-05/21-01/589

URBROJ: 525-10/0549-21-3

4/21

Također, u rijetkim slučajevima se u pasa i mačaka mogu pojaviti blage i prolazne reakcije kao što su depresija, promjene apetita, slinjenje, povraćanje i proljev.

Kao i kod drugih VMP-a za lokalnu primjenu na kožu, u preosjetljivih životinja može se pojaviti kontaktni alergijski dermatitis.

Učestalost nuspojava je određena sukladno sljedećim pravilima:

- vrlo česte (više od 1 na 10 tretiranih životinja pokazuju nuspojavu(e))
- česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja)
- manje česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 tretiranih životinja)
- rijetke (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10000 tretiranih životinja)
- vrlo rijetke (manje od 1 životinja na 10000 tretiranih životinja, uključujući izolirane slučajeve).

4.7 Primjena tijekom graviditeta, laktacije ili nesenja

Laboratorijskim istraživanjima na štakorima i kunićima nije ustanovljeno da flumetrin i imidaklopid djeluju štetno na plodnost ili razmnožavanje, a također ne iskazuju teratogene ili fetotoksične učinke. No, sigurnost primjene ovratnika nije provjerena u ciljnih vrsta tijekom graviditeta i laktacije. Stoga se proizvod ne preporučuje stavljati na gravidne kuje i mačke te kuje i mačke u laktaciji.

4.8 Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija

Nisu poznate.


4.9 Količine koje se primjenjuju i put primjene

Jedan ovratnik treba pričvrstiti životinji oko vrata.

Mačkama i psima do 8 kg t.m. stavlja se ovratnik dužine 38 cm.

Samo za primjenu izvana.

Ovratnik se neposredno prije primjene treba izvaditi iz vrećice. Potom se odmotava i provjeri da s njegove unutrašnje strane nema ostataka plastičnih spojnika. Životinji se ovratnik stavlja oko vrata, no ne smije ga se prejako stegnuti, odnosno u pravilu između ovratnika i vrata treba biti prostor širine 2 prsta. Kraj ovratnika treba provući kroz omču, a suvišak odrezati (dovoljno je ostaviti 2 cm).



Životinje moraju kontinuirano tijekom 8 mjeseci nositi ovratnik, nakon čega se ovratnik treba skinuti sa životinje. Povremeno treba provjeriti, i ako je potrebno, prilagoditi širinu ovratnika, posebice u mačića i štenadi koja brzo raste.

Na ovratniku je sigurnosna kopča. U vrlo rijetkim slučajevima u mačaka i izuzetno rijetkim slučajevima u pasa može doći do zapinjanja ovratnika, međutim, životinja ga može vlastitom snagom dovoljno proširiti da se iz njega brzo oslobodi.

4.10 Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti), ako je nužno

Zbog načina korištenja ovratnika ne očekuje se predoziranje te moguća pojava simptoma predoziranja.

FORESTO 1,25 g + 0,56 g

ovratnik za mačke i pse ≤ 8 kg

KLASA: UP/I-322-05/21-01/589

URBROJ: 525-10/0549-21-3

U odraslih mačaka i pasa koji su istodobno nosili 5 ovratnika tijekom 8 mjeseci, kao ni u mačića (u dobi 10 tjedana) i štenadi (u dobi 7 tjedana) koji su kontinuirano nosili 5 ovratnika tijekom 6 mjeseci, nisu zamijećeni drugi štetni učinci osim onih navedenih u rubrici Nuspojave. U slučaju da životinja proguta ovratnik mogu se pojaviti simptomi od strane želučano-crijevnog sustava (npr. mekši izmet).

4.11 Karencija(e)

Nije primjenjivo.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: ektoparazitocidi, insekticidi i repelenti, ektoparazitocidi za lokalnu primjenu, uključujući insekticide, piretrini i piretroidi, flumetrin u kombinaciji.

ATCvet kod: QP53AC55.

5.1 Farmakodinamička svojstva

Imidakloprid je ektoparazitocid iz skupine kloronikotinila, a djeluje protiv odraslih buha i njihovih ličinki te protiv uši.

Učinak protiv buha (*Ctenocephalides felis* i *Ctenocephalides canis*) započinje u roku 48 sati od postavljanja ovratnika.

Osim navedenog u dijelu 4.2 Indikacije, imidakloprid dokazano djeluje i protiv vrsta *Ctenocephalides canis* i *Pulex irritans*. Imidakloprid ima izraziti afinitet prema nikotinergičnim acetilkolinskim receptorima u postsinaptičkom dijelu SŽS-a buha. Time se u insektima zakoči kolinergična transmisija, zbog čega dolazi do njihove paralize i uginuća. Selektivna toksičnost imidakloprida za buhe temelji se na njegovom slabom vezanju za strukturno različite nikotinergične receptore u sisavaca, te na nemogućnosti da prođe njihovu hematoencefalnu barijeru. Stoga su sustavni farmakološki učinci imidakloprida na sisavce zanemarivi.

Flumetrin je ektoparazitocid iz skupine piretroida. To je sintetski spoj koji u membranama živčanih stanica buha i krpelja, tj. u njihovim natrijevim kanalčićima, usporava repolarizaciju. Stoga se u nametnicima poremeti prijenos podražaja, što ih paralizira te u konačnosti ubije. U istraživanjima odnosa strukture i aktivnosti brojnih piretroida, utvrđeno je da se vežu za receptore određene kiralne građe, a što je temelj njihove selektivne toksičnosti za ektoparazite. Piretroidi nisu inhibitori acetilkolinesteraze. Flumetrin iskazuje izvrstan akaricidni učinak, a u subletalnim dozama djeluje na reprodukciju krpelja, tj. onemogućuje njihovo razmnožavanje.

Ovratnik djeluje repelentno na krpelje navedene u dijelu 4.2 Indikacije, sprječavajući nametnike da uzmu krvni obrok čime se posredno umanjuje opasnost od bolesti koje se prenose tim vektorima. Uz indikacije navedene u uputi, kod mačaka je dokazana učinkovitost ovratnika protiv krpelja *Ixodes hexagonus* te na neeuropske vrste *Amblyomma americanum*, a kod pasa protiv *I. hexagonus*, *I. scapularis*, neeuropske vrste *Dermacentor variabilis* te australskog krpelja *Ixodes holocyclus* čiji toksin iz slinskih žlijezda uzrokuje krpeljnu paralizu.

Proizvod ima repelentni učinak (spriječava hranjenje) na navedene krpelje, na taj način spriječava parazite da uzmu krvni obrok a time i indirektno doprinosi smanjenju rizika prijenosa bolesti vektorima.

Kod mačaka, indirektna zaštita od prijenosa *Cytauxzoon felis* (koju prenosi *Amblyomma americanum*) dokazana je u jednom laboratorijskom ispitivanju na malom broju životinja jedan mjesec nakon aplikacije ovratnika, čime se smanjuje rizik od prijenosa ove bolesti u uvjetima ove studije.

Kod pasa, uz patogene navedene u odjeljku 4.2 (Indikacije), indirektna zaštita od prijenosa *Babesia canis* (koju prenosi *Dermacentor reticulatus*) dokazana je u jednoj laboratorijskoj studiji 28. Dan

FORESTO 1,25 g + 0,56 g

ovratnik za mačke i pse ≤ 8 kg

KLASA: UP/I-322-05/21-01/589

URBROJ: 525-10/0549-21-3

6/21

nakon aplikacije, a indirektna zaštita od prijenosa *Anaplasma phagocytophilum* (koju prenosi *Ixodes ricinus*) dokazana je laboratorijskim ispitivanjem 2 mjeseca nakon aplikacije, čime se smanjuje rizik od prijenosa ovih bolesti u uvjetima ovih studija.

Podaci iz tri terenske kliničke studije u područjima endemskim za *Leishmania infantum*, pokazala su značajno smanjenje rizika od prijenosa *Leishmania infantum* papatačima kod tretiranih pasa u usporedbi s netretiranim, dok je studija učinkovitosti na papatače (*Phlebotomus perniciosus*) pokazala varijabilno repelentno (sprječava hranjenje) djelovanje na papatače koje je iznosilo 65% do 89% tijekom 7-8 mjeseci nakon aplikacije. Postotak smanjenja infekcije iznosio je od 88,3% za stopu gustoće incidencije godišnje kod kontrolnih životinja do 66,7 do 100% za stopu gustoće incidencije od 46,2/godišnje.

U pasa koji su nosili ovratnik ublažila se infestacija šugarcima *Sarcoptes scabiei*, a cjelovito izlječenje utvrđeno je nakon tri mjeseca.

5.2 Farmakokinetički podaci

Imidakloprid i flumetrin se sporo i kontinuirano otpuštaju u malim koncentracijama iz polivinilkloridnog matriksa ovratnika na životinju. Obje djelatne tvari u dlaci psa ili mačke prisutne su u akaricidnim/insekticidnim koncentracijama tijekom cijelog razdoblja nošenja ovratnika. Aktivne tvari raspođjeljuju se s mjesta izravnog kontakta na cijelu površinu kože. U istraživanjima kinetike djelatnih tvari u krvi, kod jedinki kojima je proizvod predoziran, utvrđena je zanemariva sustavna resorpcija imidakloprida i flumetrina, a što nije od značenja za njihovu kliničku djelotvornost. Resorpcija djelatnih tvari kroz usta nije od značenja za kliničku učinkovitost.

Svojstva koja se tiču zaštite okoliša

Nema opasnosti ako se ovaj VMP koristi u skladu s uputom o VMP-u.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

Titanijev dioksid (E 171)
Željezov oksid crni (E 172)
Di-n-butiladipat
Propilenglikoldikaprilokapat
Epoksidirano sojino ulje
Stearatna kiselina
Polivinilklorid

6.2 Glavne inkompatibilnosti

Nisu poznate.

6.3 Rok valjanosti

Rok valjanosti veterinarsko-medicinskog proizvoda kad je zapakiran za prodaju: 5 godina.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju

VMP treba čuvati u originalnom pakovanju.
Ovaj VMP ne zahtijeva nikakve posebne uvjete čuvanja.

6.5 Osobine i sastav unutarnjeg pakovanja

Metalna kutija s jednim ovratnikom (38 cm) u plastičnoj vrećici (PETP/PE).

FORESTO 1,25 g + 0,56 g
ovratnik za mačke i pse ≤ 8 kg
KLASA: UP/I-322-05/21-01/589
URBROJ: 525-10/0549-21-3

6.6 Posebne mjere opreza prilikom odlaganja neupotrijebljenog veterinarsko-medicinskog proizvoda ili otpadnih materijala dobivenih primjenom tih proizvoda

Bilo koji neupotrijebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih veterinarsko-medicinskih proizvoda trebaju se odlagati u skladu s propisima o zbrinjavanju otpada.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen
Njemačka

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

UP/I-322-05/13-01/503

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/PRODULJENJA ODOBRENJA

Dana 19. srpnja 2019. godine.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Dana 16. kolovoza 2021. godine.

ZABRANA PRODAJE, OPSKRBE I/ILI PRIMJENE

Nije primjenjivo.

DODATAK III
OZNAČAVANJE I UPUTA O VMP-u

FORESTO 1,25 g + 0,56 g
ovratnik za mačke i pse \leq 8 kg
KLASA: UP/I-322-05/21-01/589
URBROJ: 525-10/0549-21-3

9/21

kolovoz 2021

A. OZNAČAVANJE

FORESTO 1,25 g + 0,56 g
ovratnik za mačke i pse ≤ 8 kg
KLASA: UP/I-322-05/21-01/589
URBROJ: 525-10/0549-21-3

10/21

kolovoz 2021

PODATCI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

{Metalna kutija s jednim ovratnikom (38 cm) u plastičnoj vrećici (PETP/PE)}

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Foresto 1,25 g + 0,56 g, ovratnik, za mačke i pse ≤ 8 kg
Imidaklopid, flumetrin

2. SASTAVDJELATNIH TVARI

1 antiparazitski ovratnik (38 cm) sadržava:

Djelatne tvari:

Imidaklopid 1,25 g

Flumetrin 0,56 g

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Sivi ovratnik, bez mirisa.

4. VELIČINA PAKOVANJA

1 x ovratnik (38 cm)

5. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mačka i pas ≤ 8 kg.

6. INDIKACIJA(E)

Suzbijanje i sprječavanje infestacije mačaka i pasa buhama i krpeljima tijekom 7 – 8 mjeseci, suzbijanje infestacije pasa paušima, kao i sprečavanje razvoja ličinki buha u neposrednom okolišu. Indirektna zaštita od bolesti mačaka i pasa koje se prenose posrednicima/vektorima (lišmanioza, erlihioza, babezioza). Vodootporan proizvod.



Krpelj



Buha



Ličinka



Pauš

Preporučuje se staviti ovratnik prije početka sezone buha i/ili krpelja, odnosno prije početka sezone povećanog rizika od infestacije.

7. NAČIN I PUT(OVI) PRIMJENE

Samo za vanjsku primjenu.

Pročitati uputu o VMP-u prije primjene.

8. KARENCIJA(E)

FORESTO 1,25 g + 0,56 g

ovratnik za mačke i pse ≤ 8 kg

KLASA: UP/I-322-05/21-01/589

URBROJ: 525-10/0549-21-3

11/21

9. POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), UKOLIKO JE POTREBNO

Pročitati uputu o VMP-u prije primjene.
Ovratnik treba čuvati u originalnom pakovanju do primjene.

10. ROK VALJANOSTI

EXP {mjesec/godina}

11. POSEBNI UVJETI ČUVANJA

12. POSEBNE MJERE OPREZAPRI ODLAGANJU NEUPOTRIJEBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Odlaganje: pročitati uputu o VMP-u.

13. RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se bez veterinarskog recepta.

14. RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen
Njemačka

16. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

UP/I-322-05/13-01/503

17. BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Seriya {broj}

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKOVANJU
{vrećica s jednim ovratnikom}

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Foresto 1,25 g + 0,56 g, ovratnik, za mačke i pse \leq 8 kg
Imidaklopid, flumetrin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH I DRUGIH TVARI

1 antiparazitski ovratnik (38 cm) sadržava:

Djelatne tvari:

Imidaklopid 1,25 g

Flumetrin 0,56 g


3. FARMACEUTSKI OBLIK

Ovratnik.

4. VELIČINA PAKOVANJA

1 x 38 cm.

5. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA



Mačka i pas \leq 8 kg.

6. INDIKACIJA(E)



7. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Za vanjsku primjenu.

8. KARENCIJA

Nije primjenjivo

9. POSEBNO(A) UPOZORENJA, UKOLIKO JE POTREBNO

10. ROK VALJANOSTI

EXP:

FORESTO 1,25 g + 0,56 g

ovratnik za mačke i pse \leq 8 kg

KLASA: UP/I-322-05/21-01/589

URBROJ: 525-10/0549-21-3

13/21

11. POSEBNI UVJETI ČUVANJA

12. POSEBNE MJERE OPREZA PRI ODLAGANJU NEUPOTRJEBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

13. RIJEČI “ SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA ” I UVJETI ILI OGRANIČENJA U POGLEDU OPSKRBE I PRIMJENE, ako je primjenjivo

Samo za primjenu na životinjama. Izdaje se bez veterinarskog recepta.

14. RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOSEGA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

15. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

BAYER

16. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

UP/I-322-05/13-01/503

17. BROJ PROIZVODNE SERIJE PROIZVOĐAČA

Lot:

B. UPUTA O VMP-u

FORESTO 1,25 g + 0,56 g
ovratnik za mačke i pse ≤ 8 kg
KLASA: UP/I-322-05/21-01/589
URBROJ: 525-10/0549-21-3

15/21

kolovoz 2021

UPUTA O VMP-u:
Foresto 1,25 g + 0,56 g, ovratnik, za mačke i pse ≤ 8 kg

1. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE SERIJE U PROMET, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet:

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Njemačka

Proizvođač odgovoran za puštanje serije u promet:

1. KVP Pharma und Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324 D-24106, Kiel, Njemačka
2. European Pharma Hub Kft., 2360 Gyál, 7000/9 hrsz., Mađarska

2. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Foresto 1,25 g + 0,56 g, ovratnik, za mačke i pse ≤ 8 kg
Imidaklopid, flumetrin

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH SASTOJAKA

1 antiparazitski ovratnik (38 cm) sadržava:

Djelatne tvari:

Imidaklopid	1,25 g
Flumetrin	0,56 g

Sivi ovratnik, bez mirisa.

4. INDIKACIJE

Mačka

Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se koristi za:

- Suzbijanje i sprječavanje infestacije mačaka buhama (*Ctenocephalides felis*) tijekom 7-8 mjeseci.
- Sprječavanje razvoja ličinki buha u neposrednom okolišu mačke tijekom 10 tjedana.
- Pomoć u liječenju i preventivnu mjeru u sprečavanju alergijskog dermatitisa uzrokovanog buhama (FAD – engl. „*flea allergy dermatitis*“).
- Proizvod ima dugotrajno akaricidno djelovanje na krpelje (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus turanicus*) i repelentni učinak (sprječava hranjenje) na krpelje (*Ixodes ricinus*) tijekom 8 mjeseci. Ovratnik je djelotvoran protiv larva, nimfa i odraslih krpelja.

Krpelji prisutni na mački prije tretmana ne moraju uginuti unutar 48 sati od stavljanja ovratnika, već mogu ostati pričvršćeni i vidljivi. Stoga se prilikom stavljanja ovratnika preporučuje ukloniti krpelje prisutne na mački. Sprječavanje infestacije novim krpeljima započinje unutar 2 dana nakon stavljanja ovratnika.

VMP se primjenjuje i za smanjenje rizika od bolesti mačaka koje se prenose posrednicima/vektorima (engl. „*Feline Vector Borne Diseases*“, FVBDs):

- bartoneloza (*Bartonella henselae*, koju prenosi *Ctenocephalides felis*),
- citauksoonoza (*Cytauxzoon felis*, koju prenosi *Ambylomma americanum*) i
- dipilidoza (*Dipylidium caninum*, koju prenosi *Ctenocephalides felis*).

Preporučuje se staviti ovratnik prije početka sezone buha i/ili krpelja, odnosno prije početka sezone povećanog rizika od infestacije.

FORESTO 1,25 g + 0,56 g

ovratnik za mačke i pse ≤ 8 kg

KLASA: UP/I-322-05/21-01/589

URBROJ: 525-10/0549-21-3

16/21

Pas

VMP se koristi za:

- Suzbijanje i sprječavanje infestacije pasa buhama (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*) tijekom 7-8 mjeseci.
 - Sprječavanje razvoja ličinki buha u neposrednom okolišu životinje tijekom 8 mjeseci.
 - Pomoć u liječenju i preventivnu mjeru u sprečavanju alergijskog dermatitisa uzrokovanog buhama (FAD – engl. „*flea allergy dermatitis*“).
 - Proizvod ima dugotrajno akaricidno djelovanje na krpelje (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*) i repelentni učinak (sprječava hranjenje) na krpelje (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) tijekom 8 mjeseci. Ovratnik je djelotvoran protiv larva, nimfa i odraslih krpelja.
- Krpelji prisutni na psu prije tretmana ne moraju uginuti unutar 48 sati od stavljanja ovratnika, već mogu ostati pričvršćeni i vidljivi. Stoga se prilikom stavljanja ovratnika preporučuje ukloniti krpelje prisutne na psu. Sprječavanje infestacije s novim krpeljima započinje unutar 2 dana nakon stavljanja ovratnika.
- Suzbijanje infestacije pasa paušima (*Trichodectes canis*).

VMP se primjenjuje i za smanjenje rizika od bolesti pasa koje se prenose posrednicima/vektorima (engl. „*Canine Vector Borne Diseases*“, CVBDs):

- babezioza (*Babesia canis* koju prenosi *Dermacentor reticulatus* i *Babesia canis vogeli* koju prenosi *Rhipicephalus sanguineus*),
- erlihioza (*Ehrlichia canis* koju prenosi *Rhipicephalus sanguineus*),
- borelijoza (*Borrelia burgdorferi s.l.* koju prenosi *Ixodes ricinus*),
- anaplazmoza (*Anaplasma phagocytophilum* koju prenosi *Ixodes ricinus* i *Anaplasma platys* koju prenosi *Rhipicephalus sanguineus*),
- dipilidoza (*Dipylidium caninum* kojeg prenosi *Ctenocephalides felis*) i
- lišmanioza (*Leishmania infantum* koju prenose papatači, npr. *Phlebotomus perniciosus*).

Preporučuje se staviti ovratnik prije početka sezone buha i/ili krpelja, odnosno prije početka sezone povećanog rizika od infestacije.

5. KONTRAINDIKACIJE

VMP se ne smije primjenjivati:

- mačićima mlađim od 10 tjedana;
- štenadi mlađoj od 7 tjedana;
- životinjama preosjetljivim na djelatne ili na bilo koju od pomoćnih tvari.

6. NUSPOJAVE

Rijetko se mogu u životinja koje nisu naviknute na nošenje ogrlica, u prvih nekoliko dana nakon stavljanja ovratnika, javiti promjene u ponašanju koje uključuju skrivanje, glasanje, hiperaktivnost, pretjerano lizanje ili čišćenje, češanje na mjestu primjene. U vrlo rijetkim slučajevima je zabilježena agresivnost nakon stavljanja ovratnika. Treba provjeriti da li je ovratnik pravilno stegnut.

Na mjestu primjene mogu se pojaviti lokalne reakcije: svrbež, crvenilo kože i gubitak dlake.

Navedene promjene su rijetke u pasa i manje česte u mačaka i spontano nestanu unutar 1-2 tjedna. U pojedinim slučajevima ovratnik treba privremeno skinuti tj. dok navedeni simptomi nestanu.

Vrlo rijetko u pasa i rijetko u mačaka mogu se pojaviti lokalne reakcije kao što su dermatitis, upala, ekcem, ozljede ili krvarenja, te je u tim slučajevima preporučljivo skinuti ovratnik.

Rijetko se u pasa mogu pojaviti neurološki simptomi kao što su ataksija, konvulzija i tremor. U tim slučajevima je preporučljivo skinuti ovratnik.

FORESTO 1,25 g + 0,56 g

ovratnik za mačke i pse ≤ 8 kg

KLASA: UP/I-322-05/21-01/589

URBROJ: 525-10/0549-21-3

17/21

Također, u rijetkim slučajevima se u pasa i mačaka mogu pojaviti blage i prolazne reakcije kao što su depresija, promjene apetita, slinjenje, povraćanje i proljev.

Kao i kod drugih VMP-a za lokalnu primjenu na kožu, u preosjetljivih životinja može se pojaviti kontaktni alergijski dermatitis.

Učestalost nuspojava je određena sukladno sljedećim pravilima:

- vrlo česte (više od 1 na 10 tretiranih životinja pokazuju nuspojavu(e))
- česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja)
- manje česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 tretiranih životinja)
- rijetke (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10000 tretiranih životinja)
- vrlo rijetke (manje od 1 životinja na 10000 tretiranih životinja, uključujući izolirane slučajeve).

Ako zamijetite bilo koju nuspojavu, čak i one koje nisu navedene u ovoj uputi o VMP-u ili mislite da veterinarsko-medicinski proizvod ne djeluje, molimo obavijestite svog veterinara.

7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mačka i pas ≤ 8 kg.

8. DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE


Jedan ovratnik treba pričvrstiti životinji oko vrata.

Mačkama i psima do 8 kg t.m. stavlja se ovratnik dužine 38 cm.

Samo za primjenu izvana.

9. SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Ovratnik se neposredno prije primjene treba izvaditi iz vrećice. Potom se odmota i provjeri da s njegove unutrašnje strane nema ostataka plastičnih spojnika. Životinji se ovratnik stavlja oko vrata, no ne smije ga se prejako stegnuti, odnosno u pravilu između ovratnika i vrata treba biti prostor širine 2 prsta. Kraj ovratnika treba provući kroz omču, a suvišak odrezati (dovoljno je ostaviti 2 cm).



Životinje moraju kontinuirano tijekom 8 mjeseci nositi ovratnik, nakon čega se ovratnik treba skinuti sa životinje. Povremeno treba provjeriti, i ako je potrebno, prilagoditi širinu ovratnika, posebice u mačića i štenadi koja brzo raste.

Na ovratniku je sigurnosna kopča. U vrlo rijetkim slučajevima u mačaka i izuzetno rijetkim slučajevima u pasa može doći do zapinjanja ovratnika, međutim, životinja ga može vlastitom snagom dovoljno proširiti da se iz njega brzo oslobodi.

10. KARENCIJA(E)

Nije primjenjivo.

FORESTO 1,25 g + 0,56 g

ovratnik za mačke i pse ≤ 8 kg

KLASA: UP/I-322-05/21-01/589

URBROJ: 525-10/0549-21-3

11. POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Držati izvan pogleda i dosega djece.

VMP treba čuvati u originalnom pakovanju.

Ovaj VMP ne zahtijeva nikakve posebne uvjete čuvanja.

12. POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:

Nakon stavljanja ovratnika postoji mogućnost da se pojedini krpelj prihvati na životinju. Stoga se u nepovoljnim okolnostima ne može u potpunosti isključiti prijenos zaraznih bolesti kojima posreduju krpelji. Krpelji će uginuti i otpustiti se s domaćina unutar 24-48 sati nakon infestacije, u pravilu bez uzimanja krvnog obroka.

Iako je dokazana znatno manja incidencija infekcije s *Leishmania infantum* u pasa, proizvod je pokazao varijabilnu repelentnu (sprječava hranjenje) i insekticidnu učinkovitost na papatače *Phlebotomus perniciosus*. Stoga se ugrizi papatača i prijenos *Leishmania infantum* ne mogu u potpunosti isključiti. Ovratnik je potrebno aplicirati prije početka razdoblja pojačane aktivnosti papatača što odgovara sezoni prijenosa *Leishmania infantum*.

Kao i kod drugih veterinarsko-medicinskih proizvoda za lokalnu primjenu na kožu, u razdoblju pojačanog linjanja (izmjena dlake) može biti prolazno i neznatno smanjen učinak kao posljedica gubitka djelatnih tvari u otpaljoj dlaci. S obzirom da se djelatne tvari iz ovratnika kontinuirano otpuštaju, odmah se počinju obnovljati učinkovite koncentracije djelatnih tvari u dlaci, bez potrebe za dodatnim tretmanom ili zamjenom ovratnika.

Za optimalni nadzor populacije buha u infestiranim domaćinstvima, preporučuje se tretirati okoliš životinja odgovarajućim insekticidom.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama

Proizvod je vodootporan tj. ostaje djelotvoran nakon šamponiranja, kupanja u vodi ili ako životinja pokisne. No, dugotrajno i obilno kupanje ili šamponiranje treba izbjegavati jer se može umanjiti dužina trajanja antiparazitskog učinka. Istraživanja su pokazala da kupanje ili šamponiranje jednom mjesečno ne umanjuje značajno trajanje učinka od 8 mjeseci protiv krpelja (nakon preraspodjele djelatnih tvari u dlaci), dok se djelotvornost na buhe postupno smanjuje počevši od 5.-og mjeseca nošenja ovratnika. Utjecaj šamponiranja ili kupanja na sprečavanje prijenosa pseće lišmanioze nije ispitan.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama

Ovratnik treba držati u vrećici koja je u vanjskoj kutiji do trenutka primjene.

Kao što vrijedi i za druge VMP, maloj djeci ne smije se dozvoliti igranje s ovratnikom, a posebno ga ne smiju stavljati u usta. Mačkama i psima koji nose ovratnik ne smije se dozvoliti da spavaju u istom krevetu s vlasnikom, a posebno ne s djecom.

Imidaklopid i flumetrin se neprekidno otpuštaju iz ovratnika u kožu i dlaku dok je ovratnik na životinji. Proizvod može u nekih ljudi potaknuti reakciju preosjetljivosti.

Osobe s poznatom preosjetljivošću (alergijom) na sastojke ovoga VMP-a trebaju izbjegavati dodir s ovratnikom.

U vrlo rijetkim slučajevima proizvod može uzrokovati nadražaj kože, očiju i dišnog sustava. U slučaju nadražaja oči, treba isprati hladnom vodom. U slučaju kožnih reakcija, treba isprati kožu sapunom i hladnom vodom. U slučaju da simptomi potraju, preporuča se potražiti pomoć liječnika i pokazati mu uputu o VMP-u ili etiketu.

Ostatke tj. višak ovratnika nakon postavljanja treba što prije neškodljivo ukloniti (vidjeti 9. Savjet za ispravnu primjenu). Nakon što se životinji pričvrstili ovratnik ruke treba oprati hladnom vodom.

FORESTO 1,25 g + 0,56 g

ovratnik za mačke i pse ≤ 8 kg

KLASA: UP/I-322-05/21-01/589

URBROJ: 525-10/0549-21-3

19/21

Graviditet i laktacija:

Laboratorijskim istraživanjima na štakorima i kunićima nije ustanovljeno da flumetrin i imidakloprid djeluju štetno na plodnost ili razmnožavanje, a također ne iskazuju teratogene ili fetotoksične učinke. No, sigurnost primjene ovratnika nije provjerena u ciljnih vrsta tijekom graviditeta i laktacije. Stoga se proizvod ne preporučuje stavljati na gravidne kuje i mačke te kuje i mačke u laktaciji.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:

Nisu poznate.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):

Zbog načina korištenja ovratnika ne očekuje se predoziranje te moguća pojava simptoma predoziranja. U odraslih mačaka i pasa koji su istodobno nosili 5 ovratnika tijekom 8 mjeseci, kao ni u mačića (u dobi 10 tjedana) i štenadi (u dobi 7 tjedana) koji su kontinuirano nosili 5 ovratnika tijekom 6 mjeseci, nisu zamijećeni drugi štetni učinci osim onih navedenih u rubrici Nuspojave. U slučaju da životinja proguta ovratnik mogu se pojaviti simptomi od strane želučano-crijevnog sustava (npr. mekši izmet).

Inkompatibilnosti:

Nisu poznate.

13. POSEBNE MJERE OPREZAPRILIKOM ODLAGANJA NEUPOTRIJEBLJENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Bilo koji neupotrijebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih veterinarsko-medicinskih proizvoda trebaju se odlagati u skladu s propisima o zbrinjavanju otpada.

14. DATUM KADA JE UPUTA O VMP-u ZADNJI PUTA ODOBRENA

Dana 16. kolovoza 2021. godine.

15. OSTALE INFORMACIJE

Samo za primjenu na životinjama.

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod izdaje se bez veterinarskog recepta.

Opremljenost:

Metalna kutija s jednim ovratnikom (38 cm) u plastičnoj vrećici (PETP/PE).

Imidakloprid i flumetrin se sporo i kontinuirano otpuštaju u malim koncentracijama iz polivinilkloridnog matriksa ovratnika na životinju. Obje djelatne tvari u dlaci psa ili mačke prisutne su u akaricidnim/insekticidnim koncentracijama tijekom cijelog razdoblja nošenja ovratnika. Aktivne tvari raspođjeljuju se s mjesta izravnog kontakta na cijelu površinu kože. U istraživanjima kinetike djelatnih tvari u krvi, kod jedinki kojima je proizvod predoziran, utvrđena je zanemariva sustavna resorpcija imidakloprida i flumetrina, a što nije od značenja za njihovu kliničku djelotvornost. Resorpcija djelatnih tvari kroz usta nije od značenja za kliničku učinkovitost.

Učinak protiv buha (*Ctenocephalides felis* i *Ctenocephalides canis*) započinje u roku 48 sati od postavljanja ovratnika. Osim navedenog u dijelu Indikacije, dokazano djeluje i protiv vrste *Pulex irritans*.

Uz indikacije navedene u uputi, kod mačaka je dokazana učinkovitost ovratnika protiv krpelja *Ixodes hexagonus* te na neeuropske vrste *Amblyomma americanum*, a kod pasa protiv *I. hexagonus*, *I.*

FORESTO 1,25 g + 0,56 g

ovratnik za mačke i pse ≤ 8 kg

KLASA: UP/I-322-05/21-01/589

URBROJ: 525-10/0549-21-3

20/21

scapularis, neeuropske vrste *Dermacentor variabilis* te australskog krpelja *Ixodes holocyclus* čiji toksin iz slinskih žlijezda uzrokuje krpeljnu paralizu.

Proizvod ima repelentni učinak (spriječava hranjenje) na navedene krpelje, na taj način sprječava parazite da uzmu krvni obrok a time i indirektno doprinosi smanjenju rizika prijenosa bolesti vektorima.

Kod mačaka, indirektna zaštita od prijenosa *Cytauxzoon felis* (koju prenosi *Amblyomma americanum*) dokazana je u jednom laboratorijskom ispitivanju na malom broju životinja jedan mjesec nakon aplikacije ovratnika, čime se smanjuje rizik od prijenosa ove bolesti u uvjetima ove studije.

Kod pasa, uz patogene navedene u odjeljku 4,2, indirektna zaštita od prijenosa *Babesia canis* (koju prenosi *Dermacentor reticulatus*) dokazana je u jednoj laboratorijskoj studiji 28. Dan nakon aplikacije, a indirektna zaštita od prijenosa *Anaplasma phagocytophilum* (koju prenosi *Ixodes ricinus*) dokazana je laboratorijskim ispitivanjem 2 mjeseca nakon aplikacije, čime se smanjuje rizik od prijenosa ovih bolesti u uvjetima ovih studija.

Studija učinkovitosti na papatače (*Phlebotomus perniciosus*) pokazala varijabilno repelentno (spriječava hranjenje) djelovanje na papatače koje je iznosilo 65% do 89% tijekom 7-8 mjeseci nakon aplikacije. Podaci iz tri terenske kliničke studije u područjima endemskim za *Leishmania infantum*, pokazala su značajno smanjenje rizika od prijenosa *Leishmania infantum* papatačima kod tretiranih pasa u usporedbi s netretiranim. Ovisno o pritisku od infekcije koju prenose papatači učinak na smanjenje rizika od infekcije s lišmaniozom iznosio je 88,3 do 100%. U pasa koji su nosili ovratnik ublažila se infestacija šugarcima *Sarcoptes scabiei*, a cjelovito izlječenje utvrđeno je nakon tri mjeseca.

Za bilo koju informaciju o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu molimo kontaktirajte lokalnog predstavnika nositelja odobrenja za stavljanje u promet.